

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI**CONCURSUL
DE MATEMATICĂ APLICATĂ
"ADOLF HAIMOVICI"****ETAPA JUDEȚEANĂ
10 martie 2018**FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL**Filiera Teoretică : profilul Real - Științe ale Naturii****Clasa a IX –a****Problema 1.**Calculați $[\sqrt{1}] + [\sqrt{2}] + [\sqrt{3}] + \dots + [\sqrt{2018}]$.**Problema 2.**Fie funcția $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = x^2 + ax - 3a$, unde $a \in \mathbb{R}$.

- a) Demonstrați că dacă $x, y \in \mathbb{R}$ și $x \cdot y = 3(x + y)$, atunci $(x - 3)(y - 3) = 9$.
b) Știind că rădăcinile ecuației $f(x) = 0$ sunt două numere întregi distincte, determinați valorile lui a .

Problema 3.În paralelogramul $ABCD$ se consideră $F \in [AB], M$ – mijlocul segmentului $[AD], N$ – mijlocul segmentului $[BC], G$ – mijlocul segmentului $[BM]$, iar $AF = 2FB$.

- a) Demonstrați că punctele D, G, F sunt coliniare.
b) Demonstrați că $\overrightarrow{DG} = \frac{3}{4}\overrightarrow{DF}$.

Problema 4.

La ora 6:00, din același depozit A, pleacă doi curieri către alte două depozite B și C, unde distanța de la A la B este egală cu distanța de la B la C și egală cu distanța de la A la C. Primul curier merge mai întâi la depozitul B, cu o viteză constantă x km/h, iar de la depozitul B la depozitul C merge cu o viteză de 3 ori mai mare. Al doilea curier merge mai întâi la depozitul C, cu o viteză constantă de 30 km/h, iar de la depozitul C la depozitul B merge cu o viteză constantă de $x + 42$ km/h. Știind că nici unul nu face pauză, iar ambii ajung la destinație la ora 9:00, determinați ora aproximativă la care s-au întâlnit cei doi curieri pe traseu.

Notă: Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI**CONCURSUL
DE MATEMATICĂ APLICATĂ
"ADOLF HAIMOVICI"****ETAPA JUDEȚEANĂ
10 martie 2018**FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL**Filiera Teoretică : profilul Real - Științe ale Naturii****Clasa a X –a****Problema 1.**

Studiind virusul gripal tip B, un cercetător a stabilit că acesta se răspândește după legea $f(t) = 1 - e^{-0,5t}$, unde $f(t)$ reprezintă procentul din populație care a venit în contact cu boala, iar t este numărul de săptămâni trecute de la semnalarea primului caz. În a câta săptămâna va fi infectată trei sferturi din populație?

Problema 2.

Fie numărul $a = \sqrt[3]{54 + 30\sqrt{3}} + \sqrt[3]{54 - 30\sqrt{3}}$.

- Verificați relația $a^3 = 18a + 108$
- Arătați că $a \in \mathbb{Q}$

Problema 3.

Fie $x_i \in [10, 100]$, $i = \overline{1, 10}$.

Să se arate ca $(\lg x_1 + \lg x_2 + \dots + \lg x_{10})(\log_{x_1} 10 + \log_{x_2} 10 + \dots + \log_{x_{10}} 10) \leq 112,5$

Problema 4.

Se da funcția $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{C}$, $f(n) = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{2} \right)^n$.

- Arătați ca f este periodică.
- Calculați $(1 - f(1)) \cdot (1 + f(2)) \cdot (1 - f(3)) \cdot \dots \cdot (1 + f(2018))$

Notă: Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘI**CONCURSUL
DE MATEMATICĂ APLICATĂ
"ADOLF HAIMOVICI"****ETAPA JUDEȚEANĂ
10 martie 2018**FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL**Filiera Teoretică : profilul Real - Științe ale Naturii****Clasa a XI –a****Problema 1.**

Se consideră funcția $f : \mathbb{R} \rightarrow [-1, +\infty)$, $f(x) = \begin{cases} x^2 + 2x + a, & x \leq 1 \\ x + 2, & x > 1 \end{cases}$.

- Demonstrați că $a \geq 0$.
- Pentru $a = 0$, trasați graficul funcției.
- Arătați că funcția f este continuă dacă și numai dacă este surjectivă.

Problema 2.

Se consideră matricea $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$.

- Determinați matricele $X \in \mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ cu proprietatea că $XA = AX$.
- Rezolvați în $\mathcal{M}_2(\mathbb{C})$ ecuația $X^3 = A$.

Problema 3.


Determinați ecuațiile asimptotelor la graficul funcției $f : \mathbb{R}^* \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = e^{\frac{1}{x}} \cdot \sqrt{x^2 + 1}$.

Problema 4.

Matricea $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ are determinantul egal cu 1.

- Schimbând între ele două dintre elementele lui A , putem obține o matrice B al cărei determinant să fie egal cu 0?
- Schimbând între ele două dintre elementele lui A , putem obține o matrice C al cărei determinant să fie egal cu -1 ?
- Schimbând între ele două dintre elementele lui A , putem obține o matrice D al cărei determinant să aibă o altă valoare decât 0, 1 sau -1 ?

Notă: Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.

INSPECTORATUL ȘCOLAR
JUDEȚEAN IAȘICONCURSUL
DE MATEMATICĂ APLICATĂ
"ADOLF HAIMOVICI"ETAPA JUDEȚEANĂ
10 martie 2018FACULTATEA
CONSTRUCȚII DE MAȘINI
ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL

Filiera Teoretică : profilul Real - Științe ale Naturii

Clasa a XII –a

Problema 1.Pe mulțimea \mathbb{Z} construim legile de compoziție $*$ și \circ definite prin: $x * y = x + y - 3$ și

$$x \circ y = xy - 3x - 3y + 12, x, y \in \mathbb{Z}$$

a) Justificați că $(\mathbb{Z}, *, \circ)$ este inel comutativ.b) Rezolvați în \mathbb{Z} ecuația $\underbrace{x \circ x \circ \dots \circ x}_{\text{de } 2018 \text{ ori } x} = 2^{2018} + 3$.c) Să se afle $a, b \in \mathbb{Z}$ astfel încât între inelele $(\mathbb{Z}, *, \circ)$ și $(\mathbb{Z}, +, \cdot)$ să existe un izomorfism de forma

$$f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, f(x) = ax + b.$$

Problema 2.Fie M mulțimea secvențelor de 8 litere majuscule din alfabetul latin (care are 26 de litere: A, B, C, ..., Z).Definim pe M legea de compoziție $\#$ astfel: dacă $x = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \lambda_6 \lambda_7 \lambda_8 \in M$ și $y = \gamma_1 \gamma_2 \gamma_3 \gamma_4 \gamma_5 \gamma_6 \gamma_7 \gamma_8 \in M$,atunci $x \# y = \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 \lambda_4 \lambda_5 \gamma_6 \gamma_7 \gamma_8$.a) Aflați cardinalul mulțimii M .b) Calculați (PARAGUAY $\#$ COLUMBIA) $\#$ BRAZILIAc) Cercetați dacă legea $\#$ este comutativă și dacă admite element neutru.**Problema 3.**a) Arătați că: $\int \frac{e^{2x}}{1+e^{4x}} dx = \frac{1}{2} \arctg(e^{2x}) + C$ b) Aflați primitivele funcției $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{(1+e^x)^4}{1+e^{4x}}$ **Problema 4.**Fie $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ și F o primitivă a sa.Dacă $F(x) \cdot f(x) = x, \forall x \in \mathbb{R}$ și $F(0) = 1$ să se afle f .Notă: Timp de lucru 4 ore; Toate subiectele sunt obligatorii; Fiecare subiect este notat cu punctaje de la 0 la 7.